

Liebe Imkerfreunde / - innen,

in diesem Jahr möchten wir anstreben, dass alle Vereinsmitglieder ihre 1. Varroabehandlung gleichzeitig unmittelbar nach der Abschleuderung durchführen, um eine Reinvasion der bereits behandelten Völker zu vermeiden.

## Varroa – Bekämpfungskonzept Schwammtuchmethode

**- zugelassen ist nur 60%ige Ameisensäure ad.us.vet. !-**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Temperaturbereich:        | 12 – 25 ° C, trockene Witterung   |
| Häufigkeit der Anwendung: | 1 – 2 mal vor und 1 mal nach der Einfütterung   |
| Dosierung:                | von oben:<br>2 ml pro Wabe DNM / Zander<br>3 ml pro Wabe 1 ½ DNM / Dadant<br>von unten:<br>3 ml pro Wabe DNM / Zander<br>4,5 ml pro Wabe 1 ½ DNM / Dadant   |
| Anwendung:                | Die tiefgekühlte Ameisensäure wird außerhalb der Beute auf das Schwammtuch gegossen und dieses direkt auf die Oberträger der Rähmchen, bzw. in die eingeschobene Varroawindel gelegt. Das Schwammtuch sollte vorab mit Wasser angefeuchtet werden, so wird die Säure besser aufgenommen.<br><br>Wichtig: Der Boden muss geschlossen, das Flugloch komplett geöffnet sein! |